



# LA CICADELLE

Les Cicadelles sont des insectes suceurs de l'ordre des hémiptères qui se nourrissent de la sève des végétaux grâce à leur rostre. Le terme « cicadelle » désignait autrefois uniquement les espèces de la famille des Cicadellidae. Il a fini par désigner toutes les espèces ressemblant à celles de cette famille et les espèces qui, par erreur, ont été initialement classées dans la famille des Cicadellidae.



CONDITIONS FAVORABLES

## Symptômes et dégâts

La cicadelle américaine adulte vit sur les rameaux tandis que ses larves d'un aspect blanc pelucheux se concentrent sur le revers des feuilles.

La larve de cicadelle, en se nourrissant, provoque l'apparition d'une marbrure pâle sur la face supérieure des feuilles. Le feuillage est couvert de miellat dans lequel prospère le champignon appelé "la fumagine".

La cicadelle des serres provoque une marbrure jaune clair sur le feuillage. La cicadelle du rosier entraîne une décoloration blanchâtre des feuilles.

Le cycle de vie des cicadelles permet trois générations par an lorsque les conditions climatiques sont clémentes.

Outre la production de miellat et la décoloration due aux piqûres sur les feuilles et les fruits, ces petits insectes sauteurs causent sont porteurs de nombreuses maladies virales qu'ils transmettent aux plantes.

MOYENS DE LUTTE

## Mesures de prophylaxie

Raisonner les apports d'engrais azotés pour éviter d'avoir des pousses trop tendres qui feraient le régal des insectes-piqueurs.

Effectuer un lâcher inondif de coccinelles et de chrysopes. Coupez et évacuez les plantes infectées.

Piéger les insectes volants avec des plaques jaunes engluées dans le feuillage.

Équiper les serres et les vérandas de filets anti-insectes.

## Méthode culturale

Pulvériser une décoction de savon noir, de macération de feuilles de rhubarbe.

Penser au purin d'ortie, de lavande, d'absinthe et de fougère pour fortifier et fertiliser les plantes. Pour se débarrasser de la cicadelle, il faut répéter le traitement jusqu'à disparition des insectes.

Type	Insectes piqueurs-suceurs
Description	Insecte de 2 à 3 mm de long ( <i>Metcalfa pruinosa</i> , l'américaine ; <i>Hauptidia maroccana</i> , dans les serres ; <i>Edwardsiana rosae</i> , du rosier...)
Période d'attaque	Été
Parties touchées	Feuilles
Plantes sensibles	arbres, arbustes, conifères, plantes d'intérieur, arbres fruitiers

## Notes